

Критерии оценки тошноты

(Национальный институт рака США)

0 степень – тошнота отсутствует

I степень – незначительно снижена возможность приёма пищи

II степень – значительно снижена возможность приёма пищи, но больной может есть

III степень – приём пищи невозможен.

Критерии оценки рвоты

(Национальный институт рака США)

0 степень – рвота отсутствует

I степень – 1 эпизод рвоты на протяжении суток (24 ч)

II степень – 2–5 эпизодов рвоты на протяжении суток.

III степень – 6 и более эпизодов рвоты на протяжении суток или необходимость внутривенной гидратации.

IV степень – необходимость парентерального питания или наличие осложнений, требующих интенсивной терапии; коллапс.

Классификация дыхательной недостаточности по степени тяжести

Дыхательная недостаточность 1 степени

Это легкая степень дыхательной недостаточности, для которой характерны следующие симптомы:

- умеренная одышка при физической нагрузке;
- цианоз носогубного треугольника;
- кожные покровы бледнорозовые;
- тахикардия;
- артериальное давление в норме.

Дыхательная недостаточность 2 степени

Это средняя степень дыхательной недостаточности, при которой у больного возникают присутствуют такие симптомы:

- наблюдается спокойная одышка;
- частое поверхностное дыхание с участием вспомогательной мускулатуры дыхание;
- цианоз кожных покровов;
- поражение нервной системы;
- соотношение частоты дыхания и частоты пульса 1 : 2,5–2,0;
- тахикардия;
- повышение артериальное давление.

Дыхательная недостаточность 3 степени

Это тяжелая степень дыхательной недостаточности, которая отличается наличием характерных симптомов:

- выраженная одышка;
- тахипноэ;
- патологический тип дыхания;
- соотношение частоты дыхания к пульсу 1 : 1–1,5;
- выраженная тахикардия (свыше 180 за 1 мин);
- кожные покровы бледноцианотичные;
- возбуждение сменяется заторможенностью;
- нарушается сознание;
- снижается артериальное давление.

Дыхательная недостаточность 4 степени

Данное состояние является гипоксемической или гиперкапнической комой. Среди симптомов выделяют:

- редкое аритмичное дыхание;
- приступы судорог;
- артериальное давление падает до 0;
- потеря сознания;
- остановка дыхания.